



**Státní
veterinární
správa**

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
El. adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



svspes9800526a

Č. j.: SVS/2025/127369
Vyřizuje: MVDr. Katarína Juhásová
Telefon: +420 541 594 439

dle rozdělovníku

V Praze dne 29. 8. 2025

Myxomatóza zajíců - informace o potvrzení v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o potvrzení **myxomatózy u zajíců v Jihomoravském kraji v honitbě v okrese Znojmo**. Nákaza byla potvrzena ve Státním veterinárním ústavu, a to v souvislosti s hlášením zvýšených úhynů zajíců v uvedené oblasti.

Myxomatóza je kontagiózní, závažné virové onemocnění, vůči kterému byl v minulosti vnímavý králík domácí a králík divoký. Došlo však k mutaci viru, která se adaptovala na zajíce. K prvnímu potvrzení tohoto zmutovaného kmene viru myxomatózy (ha-MYXV) došlo v roce 2018 u zajíce iberského v Portugalsku. Následně byl virus ha-MYXV potvrzen v roce 2024 na hranicích Německa a Nizozemska, konkrétně v části Vestfálska. Další zprávy o šíření, pocházejí z oblasti dolního Rakouska a z příhraničních oblastí, ze kterých může docházet k šíření na území České republiky.

Onemocnění se šíří především krev sajícím hmyzem (komáři) a mouchami, kteří slouží jako mechanický přenašeč nákazy. K přenosu dochází i přímým kontaktem mezi zvířaty či nepřímo kontaminovanými předměty. Typický je sezónní výskyt od května do listopadu. Virus je odolný ve vnějším prostředí.

Klinické příznaky u zvířat: otok očních víček, který způsobí, že zvíře není schopno oči otevřít, vnik uzlovitých kožních lézí tzv. myxomů. na hlavě, obličeji, uších a pyscích, ale také na konečníku a genitáliích, případně končetinách. Myxomy se objevují v průběhu několika dní, v akutních případech se mohou vytvořit i do druhého dne po infekci. Následně mohou být infikovány bakteriemi a pak se tvoří na povrchu lézí krusty, puchýřky a strupy. Postiženy jsou především sliznice hlavy, a proto bývá hlava viditelně zvětšená s typickými podkožními uzly, dochází k otoku víček, který může vést k oslepnutí. Obvykle dochází k sekundární infekci dýchacího traktu, rozvíjí se pneumonie a nákaza často končí smrtí.

Léčba onemocnění neexistuje a úmrtnost při zavlečení onemocnění do chovu je velice vysoká (50–90%).

Nejedná se o zoonózu – nákaza není přenosná na člověka.

V případě podezření na výskyt myxomatózy (klinický nález, zvýšené úhyny) prosíme o informování místně příslušné krajské veterinární správy (KVS), která na základě informací od myslivců zajistí potřebná vyšetření. Laboratorní vyšetření bude provedeno v rámci státního veterinárního dozoru a hrazeno Státní veterinární správou (SVS). Seznam KVS i s kontakty je uveden na následujícím odkazu: <https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0135>.

Z výše uvedených důvodů je pro snížení rizika šíření nákazy důležité včasné odstraňování těl uhynulých zajíců z nálezových oblastí a jejich neškodná likvidace, ať už v asanačním podniku či dostatečně hlubokým zakopáním.

S ohledem na současné klimatické podmínky, lze očekávat další šíření myxomatózy v populaci zajíců i s možností zavlečení onemocnění do chovu domácích králíků. SVS proto zároveň doporučuje chovatelům domácích králíků preventivní očkování proti myxomatóze.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Komora veterinárních lékařů ČR

Agrární komora

Česká myslivecká jednota, z.s. - Ing. Jiří Janota,

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy myslivosti a rybářství – Ing. Marek Kraus

Ministerstvo životního prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – datová schránka: dkkdkdj

Jihomoravský kraj

Český svaz chovatelů

Na vědomí

Všechny KVS SVS a MěVS SVS v Praze

Všechny SVÚ

Petra.charvatova@mo.gov.cz

Daniel.cihlar@mo.gov.cz